

PUT KROZ SAVETOVALIŠTE

UPUT OD IZABRANOG LEKARA ①

KADA SE POSUMNJA NA NASLEDNI
KARCINOM U PORODICI

GENETIČKO SAVETOVALIŠTE
ZA NASLEDNI KANCER

telefon za informacije i zakazivanje:
011/2067-284

mail:

geneticko.savetovanje.iors@ncrc.ac.rs

POPUNJAVANJE UPITNIKA
primarna evaluacija

PRE-TEST INTERVJU ②

PROCENA POTREBE TESTIRANJA NA
OSNOVU VAŽEĆIH KRITERIJUMA

Analiza porodičnog stabla,
utvrđivanje obrasca nasleđivanja i
procena rizika za prisustvo nasledne
predispozicije

NIJE TEST ZA OPŠTU POPULACIJU

ANALIZA ③

OBAVEZNO POTPISIVANJE
INFORMISANOG PRISTANKA

Analiza prisustva mutacija
u genima **ključnim** za
određeni
nasledni kancerski sindrom

POST-TEST SAVETOVANJE ④

Stručna **interpretacija rezultata**,
diskusija o daljim **preporukama** za
ispitanika i članove porodice

Zbrinjavanje ispitanika i porodice
u saradnji sa:

Klinikom za onkološku hirurgiju,
Klinikom za internističku onkologiju
IORSa

TIM GENETIČKOG SAVETOVALIŠTA

Dr sc. Ana Krivokuća, šef Odseka
Dr sc. Marija Đorđić Crnogorac
MSc Valentina Karadžić
Marijana Topalović, smlt
Vladimir Savić, smlt
Ana Nešević, smlt
Marija Đokić, smlt

geneticko.savetovanje.iors@ncrc.ac.rs

SKRINING ZA
NASLEDNI KARCINOM
DEBELOG CREVA



GENETIČKO TESTIRANJE

KADA, KAKO I KO?

Genetičko savetovanište
za nasledni kancer

STEPUP IORS



Funded by
the European Union

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije




INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE

RAK DEBELOG CREVA

STANJE U SRBIJI

60%



40%

REDOVAN SKRINING






- Kolonoskopija oko 45. godine
- Pregled stolice na prisustvo krvi
- Analize krvi
- Procena rizika za obolevanje

NASLEDNA OSNOVA

30% - **FAMILIJARNI** karcinomi debelog creva - više slučajeva u porodici

4% - 6% - **NASLEDNI** karcinom debelog creva - prisustvo sindroma u porodici

SIMPTOMI BOLESTI

-  Pojava krvi u stolici
-  Promene u ponašanju creva - dijareja, zatvor
-  Bol u stomaku
-  Gubitak u težini
-  Slabost, umor

FAKTORI RIZIKA

-  Gojaznost
-  Slaba fizička aktivnost
-  Ishrana bogata mastima i industrijski obrađenom hranom; Ishrana sa nedovoljno vlakana
-  Konzumiranje alkohola
-  Korišćenje duvanskih proizvoda
-  Inflammatorne bolesti creva
Kronova bolest
Ulcerozni kolitis

NASLEDNI SINDROMI

LINČOV SINDROM

FAMILIJARNA ADENOMATOZNA POLIPOZA - FAP

MUTYH ASOCIRANA POLIPOZA

DRUGA POLIPOZNA NASLEDNA STANJA

Nasledni sindrom podrazumeva prisustvo **genske mutacije** u određenom genu koja se **nasleđuje** i doprinosi **povišenom životnom riziku** za obolevanje

ZA SVE SIMPTOME KOJI TRAJU DUŽE OD NEKOLIKO DANA POTREBNO JE OBRATITI SE LEKARU

ZDRAVIM NAČINOM ŽIVOTA I DOBRIM ŽIVOTNIM NAVIKAMA **MOŽEMO DA UTIČEMO** NA SMANJENJE ŽIVOTNOG RIZIKA ZA NASTANAK RAKA DEBELOG CREVA

